

定期の予防接種一覧

予防接種は、市町村長が行うこととされています。

保護者は、下記の予防接種を受けさせるよう努める必要があります。

接種	対象年齢	接種回数	内容等
BCG	生後5ヵ月～12ヵ月に至るまで	1回	腕の上部に細い針が入った管を2カ所に押し付けて接種します。液が自然に乾くまで、お待ちいただきます。
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期： 11歳～12歳	1回	
不活化ポリオ	生後3ヵ月～90ヵ月に至るまで	初回3回 追加1回	・初回3回は、20から56日までの間隔をおいて受けましょう。 ・追加は初回（3回目）から1年経過後接種を行います。
麻疹風疹	1期：生後12ヵ月～24ヵ月未満 2期：5歳～7歳未満	2回	1期は1歳を過ぎたらできるだけ早めに受けましょう。
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	生後3ヵ月～90ヵ月に至るまで	初回3回 追加1回	・初回3回は、20から56日までの間隔をおいて受けましょう。 ・追加は初回（3回目）から1年経過後接種を行います。
ヒブ	生後2ヵ月～60ヵ月に至るまで	1～4回	・開始時期により、接種回数が違います。 ・追加は、初回終了後7ヵ月～13ヵ月のうちに接種を行います。
小児肺炎球菌	生後2ヵ月～60ヵ月に至るまで	1～4回	・開始時期により、接種回数が違います。 ・追加は、初回終了後60日以上あけて接種を行います。
水痘	生後12ヵ月～36ヵ月に至るまで	2回	<u>1歳を過ぎたら早めに受けましょう。</u> 初回接種（1回目）から3ヵ月以上の間隔をおいて受けましょう。（標準的には6ヵ月～12ヵ月までの間隔）
日本脳炎	1期： ①3歳に達した時から4歳に至るまで ②6歳から7歳未満の生後90ヵ月未満の者 ③18歳から20歳に至るまで	初回2回 追加1回	①②③ 初回2回は6日以上の間隔をおいて受けましょう。 ①②③ 追加は、初回終了後6ヵ月以上の間隔をおいて受けましょう。
	2期： ①9歳に達した時から10歳に至るまで ②9歳に達した時から13歳に至るまで ③18歳から20歳に至るまで	1回	② 1期完了後5年以上の間隔をおいて受けましょう。 ③ 追加接種終了後、6日以上の間隔をおいて受けましょう。
B型肝炎	生後2ヵ月～12ヵ月に至るまで	3回	・初回2回は、27日以上の間隔をおいて受けましょう。 ・追加は、初回終了後6ヵ月以上の間隔をおいて受けましょう。