

定期予防接種一覧（成人を除く）

保護者は、下記の予防接種を受けさせるよう努める必要があります。

下記の表をご覧ください、医療機関に事前予約をしたうえで接種を受けるようにしてください。

料金：無料

持ち物：町から配布された予診票、親子（母子）健康手帳、
保険証（生年月日を証明できるもの）

| 接種 | | 対象年齢 | 接種回数 | 内容等 | 助成を受けられる医療機関 | | | | | |
|--|----|------|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | 浦臼町立診療所 | 奈井江町立国保病院 | 滝川市立病院 | 明円医院 | 砂川市立病院 | |
| | | | | | TEL 68-2101 | TEL 65-2221 | TEL 22-4311 | TEL 53-2100 | TEL 54-2131 | |
| ロタウイルス | 1価 | 生 | 生後6週から24週まで | 2回 | <ul style="list-style-type: none"> 経口接種をします 1回目の接種は生後14週6日までに行い、それ以降は27日以上の間隔をおいて接種します 1価と5価の有効性は同等です | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 5価 | | 生後6週から32週まで | | | | | | | |
| B型肝炎 | | 不活化 | 生後2か月から1歳に至るまで | 3回 | <ul style="list-style-type: none"> 27日以上の間隔をおいて2回目、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小児肺炎球菌 | | 不活化 | 生後2か月から60か月に至るまで | 1～4回 | <ul style="list-style-type: none"> 開始時期により、接種回数が異なります 初回接種開始は生後2か月から7か月に至るまでに行います 追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月以降に接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五種混合 <small>百日せき・破傷風 ポリオ・ジフテリア・ヒブ</small> | | 不活化 | 生後2か月から90か月に至るまで | 4回 | <ul style="list-style-type: none"> これまでヒブ、四種混合を1度も接種していない方が接種します 初回接種は20日から56日までの間隔をおいて3回接種します 追加接種は3回目の接種から6か月～18か月までの間隔をおいて接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BCG | | 生 | 生後5か月から12か月に至るまで | 1回 | <ul style="list-style-type: none"> 腕の上部に細い針が入った管を2か所に押し付けて接種します。液が自然に乾くまで、お待ちいただきます | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 麻疹風疹 | | 生 | 1期：生後12か月～24か月未満 2期：小学校就学の始期に達する日の1年前の日から就学始期に達する日の前日まで | 1期：1回 2期：1回 | <ul style="list-style-type: none"> 1期は1歳を過ぎたらできるだけ早めに接種しましょう 2期は就学前までに接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水痘 | | 生 | 生後12か月から36か月に至るまで | 2回 | <ul style="list-style-type: none"> 3か月以上（標準的には6か月～12か月）の間隔をおいて2回目を接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本脳炎 | | 不活化 | 1期：3歳から7歳未満 | 3回 | <ul style="list-style-type: none"> 6～28日の間隔をおいて2回目、その後6か月～1年の間隔をおいて3回目を接種します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 2期：9歳以上13歳未満 | 1回 | | | | | | |
| | | | 1期2期：H9.4.2～H19.4.1生まれで、20歳未満の方 | 4回 | <ul style="list-style-type: none"> 6～28日の間隔をおいて2回目、その後6か月～1年の間隔をおいて3回目、その後6～28日の間隔をおいて4回目を接種します | | | | | |
| 二種混合 <small>（ジフテリア・破傷風）</small> | | 不活化 | 小学6年生の1年間 | 1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒトパピローマウイルス <small>（子宮頸がん）</small> | 9価 | 不活化 | 小学6年生から高校1年生に相当する年度まで | 2回 | <ul style="list-style-type: none"> 6か月の間隔をおいて2回接種します 15歳になってから接種する場合は3回接種になります | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RSウイルス感染症 | | 不活化 | 妊娠28週0日～36週6日までの妊婦の方 | 1回 | <ul style="list-style-type: none"> 妊婦の方が接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行する母子免疫ワクチンです 1度の妊娠につき1回接種します | × | × | × | × | ○ |

問い合わせ先 浦臼町保健センター内

こども家庭センター（子育て支援係）TEL 69-2100