

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間: 令和5年7月22日～令和5年8月3日

調査日: 令和5年8月3日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	19	2.71	
②	鶴沼第2	9	1.29	
③	鶴沼第3	3	0.43	
④	浦臼第1	12	1.71	
⑤	浦臼第2	10	1.43	
⑥	浦臼6草原	5	0.71	
⑦	浦臼第7	27	3.86	
⑧	浦臼第8A	1	0.14	
⑨	浦臼第8B	2	0.29	
⑩	晩生内第1	3	0.43	
⑪	晩生内第3A	1	0.14	
⑫	晩生内第3B	16	2.29	
平均値		9.0	1.3	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。

※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。