

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間:令和6年7月11日～令和6年7月18日

調査日:令和6年7月18日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	26	3.71	
②	鶴沼第2	31	4.43	
③	鶴沼第3	187	26.71	
④	浦臼第1	26	3.71	
⑤	浦臼第2	19	2.71	
⑥	浦臼6草原	21	3.00	
⑦	浦臼第7	17	2.43	
⑧	浦臼第8A	5	0.71	
⑨	浦臼第8B	12	1.71	
⑩	晩生内第1	11	1.57	
⑪	晩生内第3A	4	0.57	
⑫	晩生内第3B	20	2.86	
平均値		31.6	4.5	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。

※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。