

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間:令和6年8月2日～令和6年8月8日

調査日:令和6年8月8日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	12	1.71	
②	鶴沼第2	5	0.71	
③	鶴沼第3	0	0.00	
④	浦臼第1	2	0.29	
⑤	浦臼第2	27	3.86	
⑥	浦臼6草原	11	1.57	
⑦	浦臼第7	9	1.29	
⑧	浦臼第8A	1	0.14	
⑨	浦臼第8B	5	0.71	
⑩	晩生内第1	0	0.00	
⑪	晩生内第3A	5	0.71	
⑫	晩生内第3B	7	1.00	
平均値		7.0	1.0	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。

※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。