

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間: 令和8年7月16日～令和8年7月23日

調査日: 令和8年7月23日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	5	0.71	
②	鶴沼第2	8	1.14	
③	鶴沼第3	6	0.86	
④	浦臼第1	17	2.43	
⑤	浦臼第2	13	1.86	
⑥	浦臼6草原	18	2.57	
⑦	浦臼第7	20	2.86	
⑧	浦臼第8A	10	1.43	
⑨	浦臼第8B	6	0.86	
⑩	晩生内第1	5	0.71	
⑪	晩生内第3A	2	0.29	
⑫	晩生内第3B	7	1.00	
平均値		9.8	1.4	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。

※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。