

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間: 令和8年8月6日～令和8年8月13日

調査日: 令和8年8月13日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	1	0.14	
②	鶴沼第2	0	0.00	
③	鶴沼第3	1	0.14	
④	浦臼第1	6	0.86	
⑤	浦臼第2	1	0.14	
⑥	浦臼6草原	0	0.00	
⑦	浦臼第7	1	0.14	
⑧	浦臼第8A	7	1.00	
⑨	浦臼第8B	3	0.43	
⑩	晩生内第1	7	1.00	
⑪	晩生内第3A	2	0.29	
⑫	晩生内第3B	1	0.14	
平均値		2.5	0.4	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。
※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。